

Apel do hodowców trzody chlewnej



Główny Inspektorat
Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (*African swine fever - ASF*) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia **ASF** w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! **Ludzie nie są wrażliwi**
na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:

nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów **jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.**

X @WetGIW

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Łuków, dnia 5 czerwca 2025 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁUKOWIE

Agnieszka Dymek

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ!!!

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, podczas którego ryzyko transmisji wirusa ASF ze środowiska naturalnego do gospodarstw utrzymujących świnie znacząco wzrasta, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

Najważniejsze zasady:

- Niewpuszczanie osób postronnych do chlewni;
- Używanie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi świń;
- Zabezpieczenie budynków przed dostępem innych zwierząt, w tym dzikich;
- Nieskarmianie świń odpadkami kuchennymi ani zielonką niewiadomego pochodzenia;
- Regularna dezynfekcja sprzętu, środków transportu, utrzymanie mat dezynfekcyjnych w stanie pozwalającym na skuteczną dezynfekcję;
- Zgłaszanie upadków oraz niepokojących objawów chorobowych lekarzowi weterynarii.

Objawy kliniczne ASF: nagłe padnięcia świń, gorączka, biegunka, wymioty, wybroczyny na skórze, sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, ronienia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łukowie

Agnieszka Dymek



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Warszawska 16, 21-400 Łuków
tel.: (25) 798-26-13, fax: (25) 798-25-19, e-mail: lukow.piw@wiw.lublin.pl.



Główny Inspektorat
Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:

nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązkiem natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.



§

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI z dnia 24
kwietnia 2024 r. w sprawie
środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru
świń**

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach

zabezpieczaj budynek przed dostępem
innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z
pomieszczeń używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
lub wyłóż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem
i wyjazdem z gospodarstwa oraz
wybiegu używaj urządzeń
zapewniających skuteczną dezynfekcję
(niecki dezynfekcyjne lub maty
dezynfekcyjne)

karm świnie paszą zabezpieczoną przed
dostępem innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy
świnach odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do
obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem
pochodzącym z obszarów objętych
ograniczeniami II, III (**chyba że** zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 30 dni)

wykorzystywania słomy na ściółkę
pochodzącej z obszarów objętych
ograniczeniami II i III (**chyba że** zastosowano
obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla
dzików przez co najmniej 90 dni)

obsługi świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 48 godzin uczestniczyły w
polowaniu lub odłowię zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz,
produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do
budynków, w których są utrzymywane
świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do
innych gospodarstw